	φ_{r_1}
α_1	$-1.0442 \cdot 10^{-3}$
β_1	$1.4245 \cdot 10^{-4}$
γ_1	$-5.2079 \cdot 10^{-5}$
η_1	$-2.0064 \cdot 10^{-7}$
ϑ_1	$-2.1799 \cdot 10^{-4}$
ρ_1	$1.5240 \cdot 10^{-7}$

	φ_{r_2}
α_2	$2.7239 \cdot 10^{-2}$
β_2	$4.8362 \cdot 10^{1}$
γ_2	$-4.6687 \cdot 10^{-3}$
η_2	$-4.2292 \cdot 10^{0}$
ϑ_2	$1.9144 \cdot 10^{-6}$
ρ_2	$-9.5777 \cdot 10^{1}$

	φ_{r_3}
α_3	$-1.9867 \cdot 10^{3}$
β_3	$1.5710 \cdot 10^{5}$
γ_3	$e5.8019 \cdot 10^{2}$
η_3	$9.4769 \cdot 10^{-1}$

	φ_{r_4}
α_4	$1.4750 \cdot 10^{-4}$
β_4	$1.4241 \cdot 10^{-4}$
γ_4	$5.5169 \cdot 10^{-5}$
η_4	$-1.9502 \cdot 10^{-7}$
ϑ_4	$-2.1777 \cdot 10^{-4}$
ρ_4	$1.5362 \cdot 10^{-7}$

	φ_{r_5}
α_5	$-1.2614 \cdot 10^{-2}$
β_5	$1.7093 \cdot 10^{-3}$
γ_5	$-6.2481 \cdot 10^{-4}$
η_5	$-2.4072 \cdot 10^{-6}$
ϑ_5	$-2.6152 \cdot 10^{-3}$
ρ_5	$1.8294 \cdot 10^{-6}$

	φ_{r_6}
α_6	$-1.0442 \cdot 10^{-3}$
β_6	$1.4245 \cdot 10^{-4}$
γ_6	$-5.2079 \cdot 10^{-5}$
η_6	$-2.0064 \cdot 10^{-7}$
ϑ_6	$-2.1799 \cdot 10^{-4}$
ρ_6	$1.5240 \cdot 10^{-7}$

	φ_{r_7}
α_7	$-1.0734 \cdot 10^{-4}$
β_7	$3.3287 \cdot 10^{-5}$
γ_7	$-1.9579 \cdot 10^{-10}$

	φ_{r_8}
α_8	$5.2981 \cdot 10^{-7}$
β_8	$5.9746 \cdot 10^{-3}$
γ_8	$2.6776 \cdot 10^{-11}$

Table 1: Numeric values of polynomial coefficients associated to the flux regulation maps of NPQ phenomenon.