

Il tableau¹ “classico”: un sussidio alla gestione dei conteggi

Il tableau si è imposto come scrittura compatta di un dizionario nella didattica della Programmazione Lineare. Spesso i vari elementi, teorici ed algoritmici, che compongono la PL vengono introdotti come metodi di manipolazione del tableau che conducano ai risultati desiderati. Se avrete altre occasioni di incontro con la PL vi dovrete probabilmente confrontare con il tableau. Conviene pertanto impadronirsi ora di questo approccio con relativo linguaggio e tecnicità. Proponiamo l'uso del tableau svolgendo qui di seguito alcuni semplici esercizi di programmazione lineare attenendoci a procedimenti standard di soluzione.

Il presente documento adotta un formato di tableau che chiameremo classico in quanto si era andato affermando ormai ubiquitosamente entro la fine del secolo scorso. Un nuovo formato di tableau fu introdotto e proposto da Robert Vanderbei nel suo libro di testo “Linear Programming: Foundations and Extensions” del 1997. Questo tableau “alla Vanderbei” presenta dei vantaggi ma ancora resta pervasivo l'uso di convenzioni precedenti ed è possibile ti capiterà di confrontarti con entrambe le versioni del tableau (e forse anche altre). Il presente documento ha un fratello gemello che compie il medesimo percorso ma impiegando il tableau alla Vanderbei invece che quello classico. Se interessati al tableau alla Vanderbei si consulti il documento gemello.

Condurre il simplesso col tableau.

Al seguente problema di PL associa il corrispondente tableau:

$$\begin{cases} \max & 6x_1 + 7x_2 \\ & \begin{cases} 2x_1 + 3x_2 \leq 12 \\ 2x_1 + x_2 \leq 8 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases} \end{cases} \quad \Longrightarrow \quad \begin{array}{cc|cc} & & x_1 & x_2 \\ x_3 & 2 & 3 & 12 \\ x_4 & 2 & 1 & 8 \\ z & -6 & -7 & 0 \end{array}$$

Dove x_3 ed x_4 indicano le variabili di slack. Osserviamo che i coefficienti della funzione obiettivo (o costi) vengono riportati nel tableau col segno rovesciato e che alla funzione obiettivo corrisponde (nella prassi diffusa) l'ultima riga.

A dire il vero il tableau non corrisponde propriamente ad un problema di PL ma ad un particolare dizionario di un problema di PL ossia ad un problema di PL visto dalla particolare prospettiva di una sua soluzione di base (ammissibile o meno). Il caso di cui sopra era fortuito: essendo il problema in forma standard era possibile scriverne direttamente un primo tableau.

Domanda 1 *A quale soluzione di base si riferisce il tableau dato sopra?*

Risposta: tutte le variabili di decisione fuori base ($x_1 = x_2 = 0$) mentre $x_3 = 12$ ed $x_4 = 8$.

In corrispondenza di una qualsiasi soluzione, la funzione obiettivo assume un determinato valore, che viene riportato a destra nell'ultima riga del tableau.

In generale, il seguente dizionario è più compattamente descritto in forma di tableau:

¹“tableau” si pronuncia come fosse scritto tablò

$$\begin{array}{rcccccccc}
x_{n+1} & = & b_1 & -a_{1,1}x_1 & \dots & -a_{1,j}x_j & \dots & -a_{1,n}x_n \\
\dots & & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\
x_{n+i} & = & b_i & -a_{i,1}x_1 & \dots & -a_{i,j}x_j & \dots & -a_{i,n}x_n \\
\dots & & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\
x_{n+m} & = & b_m & -a_{m,1}x_1 & \dots & -a_{m,j}x_j & \dots & -a_{m,n}x_n \\
z & = & v & +c_1x_1 & \dots & +c_jx_j & \dots & +c_nx_n
\end{array}
\iff
\begin{array}{rcccccccc}
& & & x_1 & \dots & x_j & \dots & x_n & & \\
x_{n+1} & a_{1,1} & \dots & a_{1,j} & \dots & a_{1,n} & & & & b_1 \\
\dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & & & & \dots \\
x_{n+i} & a_{i,1} & \dots & a_{i,j} & \dots & a_{i,n} & & & & b_i \\
\dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & & & & \dots \\
x_{n+m} & a_{m,1} & \dots & a_{m,j} & \dots & a_{m,n} & & & & b_m \\
z & -c_1 & \dots & -c_j & \dots & -c_n & & & & v
\end{array}$$

Ecco un secondo esempio:

PROBLEMA DI PL

$$\begin{cases}
\min 2x_1 + 7x_2 - 2x_3 \\
x_1 + 2x_2 + x_3 \leq 1 \\
-4x_1 - 2x_2 + 3x_3 \leq 2 \\
x_1, x_2, x_3 \geq 0
\end{cases}$$

DIZIONARIO INIZIALE

$$\begin{array}{rcccc}
x_4 & = & 1 & -x_1 & -2x_2 & -x_3 \\
x_5 & = & 2 & +4x_1 & +2x_2 & -3x_3 \\
z & = & 0 & +2x_1 & +7x_2 & -2x_3
\end{array}$$

TABLEAU

$$\begin{array}{rcccc}
& & x_1 & x_2 & x_3 & \\
x_4 & 1 & 2 & 1 & 1 & \\
x_5 & -4 & -2 & \boxed{3} & 2 & \\
z & -2 & -7 & 2 & 0 &
\end{array}$$

Domanda 2 Secondo te, perché il $\boxed{3}$ nel tableau sopra è stato incorniciato?

Risposta: Il $\boxed{3}$ è l'elemento di pivot.

Domanda 3 Come sceglieresti l'elemento di pivot direttamente dal tableau?

Possibile Risposta: Come colonna di pivot si sceglie una qualsiasi colonna \bar{j} avente l'ultimo elemento $-c_{\bar{j}}$ maggiormente positivo (+2 nella terza colonna) dacchè stiamo minimizzando.

La scelta della riga di pivot si effettua considerando tutti gli $a_{i,\bar{j}}$ positivi. Tra questi, quello che minimizza il rapporto $b_i/a_{i,\bar{j}}$, è l'elemento di pivot.

Esercizio 1 La regola ora introdotta per la scelta dell'elemento di pivot non dovrebbe esserti del tutto nuova. Sapresti proporre ora una seconda regola per la scelta dell'elemento di pivot nel tableau?

Eseguiamo ora il passo di pivot nel dizionario e scopriamo così come debba venir aggiornato il tableau.

DIZIONARIO INIZIALE

$$\begin{array}{rcccc}
x_4 & = & 1 & -x_1 & -2x_2 & -x_3 \\
x_5 & = & 2 & +4x_1 & +2x_2 & -3x_3 \\
z & = & 0 & +2x_1 & +7x_2 & -2x_3
\end{array}$$

↓ (pivot)

TABLEAU INIZIALE

$$\begin{array}{rcccc}
& & x_1 & x_2 & x_3 & \\
x_4 & 1 & 2 & 1 & 1 & \\
x_5 & -4 & -2 & \boxed{3} & 2 & \\
z & -2 & -7 & 2 & 0 &
\end{array}$$

↓ (pivot)

NUOVO DIZIONARIO

$$\begin{aligned} x_4 &= \frac{1}{3}x_1 - \frac{7}{3}x_2 + \frac{1}{3}x_3 \\ x_3 &= \frac{4}{3}x_1 + \frac{1}{3}x_2 - \frac{1}{3}x_5 \\ z &= -\frac{4}{3}x_1 + \frac{17}{3}x_2 + \frac{1}{3}x_5 \end{aligned}$$

\iff

NUOVO TABLEAU

$$\begin{array}{cccc} & x_1 & x_2 & x_5 \\ x_4 & \boxed{\frac{7}{3}} & \frac{8}{3} & -\frac{1}{3} \\ x_3 & -\frac{4}{3} & -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ z & \frac{4}{3} & -\frac{17}{3} & -\frac{1}{3} \end{array}$$

Nel tableau, siano \bar{i} e \bar{j} la riga e la colonna di pivot. Sia $p = a_{\bar{i},\bar{j}}$ il valore dell'elemento di pivot. Ecco la regola generale per eseguire il pivot direttamente sul tableau:

$$\begin{array}{cccccc|cccc} & x_1 & \dots & x_{\bar{j}} & \dots & x_n & & & & & & \\ x_{n+1} & a_{1,1} & \dots & a_{1,\bar{j}} & \dots & a_{1,n} & b_1 & x_{n+1} & \dots & \dots & -\frac{a_{1,\bar{j}}}{p} & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots \\ x_{n+\bar{i}} & a_{\bar{i},1} & \dots & a_{\bar{i},\bar{j}} & \dots & a_{\bar{i},n} & b_{\bar{i}} & x_{\bar{j}} & \frac{a_{\bar{i},1}}{p} & \dots & \frac{1}{p} & \dots & \frac{a_{\bar{i},n}}{p} & \frac{b_{\bar{i}}}{p} \\ \dots & \dots \\ x_{n+m} & a_{m,1} & \dots & a_{m,\bar{j}} & \dots & a_{m,n} & b_m & x_{n+m} & \dots & \dots & -\frac{a_{m,\bar{j}}}{p} & \dots & \dots & \dots \\ z & -c_1 & \dots & -c_{\bar{j}} & \dots & -c_n & v & z & \dots & \dots & +\frac{c_{\bar{j}}}{p} & \dots & \dots & \dots \end{array} \implies$$

Gli elementi non specificati del secondo tableau si modificano come segue: $a_{i,j}$ diviene $a_{i,j} - \frac{a_{\bar{i},j}a_{i,\bar{j}}}{p}$ e similmente c_j diviene $c_j - \frac{a_{\bar{i},j}c_{\bar{j}}}{p}$. Inoltre b_i diviene $b_i - \frac{a_{\bar{i},j}b_{\bar{i}}}{p}$ e v diviene $v - \frac{-c_{\bar{j}}b_{\bar{i}}}{p}$.

In pratica l'operazione di pivot viene spesso condotta come la sequenza di 5 passi illustrata nelle seguenti figure.

1. Le variabili associate alla riga ed alla colonna di pivot si scambiano tra di loro.

$$\begin{array}{cccc|cc} & x_1 & x_2 & \mathbf{x_3} & & & \\ x_4 & 1 & 2 & 1 & 1 & & \\ \mathbf{x_5} & -4 & -2 & 3 & 2 & & \\ z & -2 & -7 & 2 & 0 & & \end{array} \implies \begin{array}{ccc|c} & x_1 & x_2 & \mathbf{x_5} \\ x_4 & & & \\ \mathbf{x_3} & & & \\ z & & & \end{array}$$

Figura 1: Primo passaggio: scambio delle etichette della riga e della colonna di pivot.

2. L'elemento di pivot diviene $p' := \frac{1}{p}$, dove $p := a_{\bar{i},\bar{j}}$ era il valore del pivot prima che avvenga il passo di pivot.

$$\begin{array}{cccc|cc} & x_1 & x_2 & \mathbf{x_3} & & & \\ x_4 & 1 & 2 & 1 & 1 & & \\ \mathbf{x_5} & -4 & -2 & \mathbf{3} & 2 & & \\ z & -2 & -7 & 2 & 0 & & \end{array} \implies \begin{array}{ccc|c} & x_1 & x_2 & \mathbf{x_5} \\ x_4 & & & \\ \mathbf{x_3} & & & \frac{1}{3} \\ z & & & \end{array}$$

Figura 2: Secondo passaggio: ricalcolo dell'elemento di pivot.

3. Gli elementi contenuti nella colonna di pivot vengono divisi per p (o moltiplicati per p') ed invertiti in segno.

$$\begin{array}{cccc|c}
& x_1 & x_2 & x_3 & \\
x_4 & 1 & 2 & \mathbf{1} & 1 \\
x_5 & -4 & -2 & 3 & 2 \\
z & -2 & -7 & \mathbf{2} & 0
\end{array}
\Rightarrow
\begin{array}{cccc|c}
& x_1 & x_2 & x_5 & \\
x_4 & & & -\frac{1}{3} & \\
x_3 & & & \frac{1}{3} & \\
z & & & \frac{2}{3} & \\
& & & \mathbf{3} &
\end{array}$$

Figura 3: Terzo passaggio: ricalcolo della colonna di pivot.

$$\begin{array}{cccc|c}
& x_1 & x_2 & x_3 & \\
x_4 & 1 & 2 & 1 & 1 \\
x_5 & -4 & -2 & 3 & \mathbf{2} \\
z & -2 & -7 & 2 & 0
\end{array}
\Rightarrow
\begin{array}{cccc|c}
& x_1 & x_2 & x_5 & \\
x_4 & & & -\frac{1}{3} & \\
x_3 & -\frac{4}{3} & -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} & \mathbf{\frac{2}{3}} \\
z & & & -\frac{2}{3} &
\end{array}$$

Figura 4: Quarto passaggio: ricalcolo della riga di pivot.

4. Gli elementi contenuti nella riga di pivot vengono divisi per p (o moltiplicati per p').
5. Ogni elemento del tableau che non appartenga nè alla riga nè alla colonna di pivot viene modificato come segue: $a_{i,j}$ diviene $a_{i,j} - \frac{a_{i,j}a_{i,\bar{j}}}{p}$ e c_j diviene $c_j - \frac{a_{i,j}c_j}{p}$. Inoltre b_i diviene $b_i - \frac{a_{i,\bar{j}}b_i}{p}$ e v diviene $v - \frac{-c_{\bar{j}}b_i}{p}$. In realtà abbiamo solo dettagliato tre scritte per quella che in fondo è un'unica regola di aggiornamento omogenea che vale per tutti gli elementi fuori dalla riga e dalla colonna di pivot.

$$\begin{array}{cccc|c}
& x_1 & x_2 & x_3 & \\
x_4 & \mathbf{1} & \mathbf{2} & \mathbf{1} & \mathbf{1} \\
x_5 & -4 & -2 & 3 & 2 \\
z & -2 & -7 & 2 & 0
\end{array}
\Rightarrow
\begin{array}{cccc|c}
& x_1 & x_2 & x_5 & \\
x_4 & \frac{7}{3} & \frac{8}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\
x_3 & -\frac{4}{3} & -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\
z & \frac{2}{3} & -\frac{17}{3} & -\frac{2}{3} & -\frac{4}{3}
\end{array}$$

Figura 5: Quinto passaggio: ricalcolo degli altri elementi.

La regola poteva anche essere data con riferimento ai nuovi valori sulla colonna e riga di pivot, ossia $a'_{i,j} \leftarrow a_{i,j} + \frac{a'_{i,j}a'_{i,\bar{j}}}{p'}$. Quindi $a_{i,j} = a'_{i,j} - \frac{a'_{i,j}a'_{i,\bar{j}}}{p'}$.

Domanda 4 Cosa succede se facciamo pivot due volte di seguito sullo stesso elemento di pivot?

Ma ritorniamo al nostro problema di PL ed eseguiamo il prossimo passo di pivot.

$$\begin{array}{cccc|c}
& x_1 & x_2 & x_5 & \\
x_4 & \boxed{\frac{7}{3}} & \frac{8}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\
x_3 & -\frac{4}{3} & -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\
z & \frac{2}{3} & -\frac{17}{3} & -\frac{2}{3} & -\frac{4}{3}
\end{array}
\rightarrow
\begin{array}{cccc|c}
& x_4 & x_2 & x_5 & \\
x_1 & \frac{3}{7} & \frac{8}{7} & -\frac{1}{7} & \frac{1}{7} \\
x_3 & \frac{4}{7} & \frac{6}{7} & \frac{1}{7} & \frac{6}{7} \\
z & -\frac{2}{7} & -\frac{45}{7} & -\frac{4}{7} & -\frac{10}{7}
\end{array}$$

Gli elementi dell'ultima riga sono ora tutti negativi. Possiamo pertanto concludere che il valore ottimo del nostro problema era $-\frac{10}{7}$. (Perchè?) La soluzione primale ottima è $x_2 = x_4 = x_5 = 0$ con $x_1 = \frac{1}{7}$ e $x_3 = \frac{6}{7}$. La soluzione duale ottima è $y_1 = y_3 = 0$ con $y_2 = -\frac{45}{7}$, $y_4 = -\frac{2}{7}$ e $y_5 = -\frac{4}{7}$ ed è anch'essa espressa nel tableau.

Di fatto è persino possibile ricavare il tableau del problema duale dal tableau del problema primale.

TABLEAU PRIMALE						TABLEAU DUALE			
	x_4	x_2	x_5	$\frac{1}{2}$			y_1	y_3	
x_1	$\frac{3}{7}$	$\frac{8}{7}$	$-\frac{1}{7}$	$\frac{1}{7}$	\iff	y_4	$-\frac{3}{7}$	$-\frac{4}{7}$	$-\frac{2}{7}$
x_3	$\frac{4}{7}$	$\frac{6}{7}$	$\frac{1}{7}$	$\frac{2}{7}$		y_2	$-\frac{8}{7}$	$-\frac{6}{7}$	$-\frac{45}{7}$
z	$-\frac{2}{7}$	$-\frac{45}{7}$	$-\frac{4}{7}$	$-\frac{10}{7}$		y_5	$\frac{1}{7}$	$-\frac{1}{7}$	$-\frac{4}{7}$
						z	$-\frac{1}{7}$	$-\frac{2}{7}$	$-\frac{10}{7}$

Dove la variabile duale y_4 corrisponde alla variabile di slack x_4 e cioè è il moltiplicatore del primo vincolo. La variabile duale y_1 corrisponde alla variabile primale x_1 che è il moltiplicatore del primo vincolo duale, ossia y_1 è la variabile di surplus nel primo vincolo duale.

Domanda 5 *Quale è la regola per passare dal tableau del primale al tableau del duale?*

Esercizio 2 *Verificare che l'ultimo tableau proposto è il tableau per il problema duale all'ottimo.*

Domanda 6 *Nell'ultimo tableau il prodotto $x_i \cdot y_i$ è nullo per ogni i . Sai darne una ragione semplice? Questa proprietà vale solo per l'ultimo tableau?*

Attenzione!!! **1** *Si noti come la regola per passare dal tableau del primale al tableau del duale non sia idempotente ossia differisca dalla regola per passare dal tableau del duale a quello del primale. Ciò è in contrasto con il fatto che il duale del duale di un problema di PL è di nuovo il problema originale. Tale contrasto è tuttavia solo apparente: nel passare da un problema di PL al suo duale dovevo distinguere le disuguaglianze \leq da quelle \geq .*

La convenzione classica per il tableau rompe questa simmetria primale/duale con una scelta arbitraria di segni. Il vantaggio è quello di una semplice regola di pivot unica per il primale ed il duale.

Qualora si debba massimizzare la funzione obiettivo allora seguiamo la stessa procedura, solo che ora miriamo ad ottenere valori non negativi nell'ultima riga. Ad esempio:

$$\max 2x_1 + 7x_2 - 2x_3$$

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 \leq 1 \\ -4x_1 + -2x_2 + 3x_3 \leq 2 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{cases}$$

x_4	x_1	x_2	x_3		x_2	x_1	x_4	x_3
1	1	2	1	\rightarrow	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$
x_5	-4	-2	3		x_5	-3	1	4
z	-2	-7	2		z	$\frac{3}{2}$	$\frac{7}{2}$	$\frac{11}{2}$

Il valore ottimo della funzione obiettivo è ora $\frac{7}{2}$. La soluzione primale ottima è $x_1 = x_3 = 0$ con $x_2 = \frac{1}{2}$. La soluzione duale ottima è $y_2 = 0$ con $y_1 = \frac{3}{2}$.

LA PROVA DI CONTROLLO

Anche la PL ha la sua prova del nove. Si assegna ad ogni variabile il valore del coefficiente di quella variabile nella funzione obiettivo originaria. Ad esempio l'ultimo tableau diviene:

$$\begin{array}{rcccc}
 & & (2) & (0) & (-2) \\
 & & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\
 & & x_1 & x_4 & x_3 \\
 (7) \rightarrow & x_2 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\
 (0) \rightarrow & x_5 & -3 & 1 & 4 & 3 \\
 & z & \frac{3}{2} & \frac{7}{2} & \frac{11}{2} & \frac{7}{2}
 \end{array}$$

Per ogni colonna vale quanto segue: il valore del coefficiente associato alla colonna più il valore dell'ultimo elemento della colonna eguaglia la somma degli altri elementi della colonna ciascuno moltiplicato per il coefficiente della riga cui appartiene.

Colonna 1: $\frac{1}{2}(7) - 3(0) = (2) + \frac{3}{2}$.

Colonna 2: $\frac{1}{2}(7) + 1(0) = (0) + \frac{7}{2}$.

Colonna 3: $\frac{1}{2}(7) + 4(0) = (-2) + \frac{11}{2}$.

Colonna 4: $\frac{1}{2}(7) + 3(0) = \frac{7}{2}$.

Queste relazioni valgono per ogni tableau, non necessariamente ottimale.

Per maggiori dettagli ed approfondimenti relativi alla prova del nove della PL, si consulti il documento dedicato.

Il tableau ed il metodo del simplesso duale

Consideriamo un problema in forma standard e si assuma per fissare le idee che esso sia un problema di massimizzazione. Si assuma inoltre che tutti i coefficienti della funzione obiettivo siano non-positivi. Pertanto nel primo tableau i coefficienti nell'ultima riga sono di già non-negativi, come li vorremmo nell'ultimo tableau. Un tale tableau è detto *duale ammissibile*. Se poi tutti i coefficienti nell'ultima colonna sono non-negativi allora la soluzione di base corrente è ammissibile ed il problema è già risolto. Altrimenti si applica il metodo del simplesso duale. Una caratteristica interessante del metodo del simplesso duale sul tableau è che l'operazione di pivot si esplica esattamente come la regola di pivot per il simplesso primale. L'unica differenza operativa tra i due metodi sta nella scelta dell'elemento di pivot che nel caso del simplesso duale segue la stessa filosofia già richiamata per il simplesso primale.

Domanda 7 *Come sceglieresti l'elemento di pivot direttamente dal tableau?*

Possibile Risposta: Come riga di pivot si sceglie una qualsiasi riga \bar{j} avente l'ultimo elemento $b_{\bar{i}}$ negativo (magari quello maggiormente negativo) dacchè si mira ad ottenere anche l'ammissibilità primale (e quindi l'ottimalità).

La scelta della colonna di pivot si effettua considerando tutti gli $a_{\bar{i},j}$ negativi. Tra questi, quello che minimizza il rapporto $|c_j/a_{\bar{i},j}|$, è l'elemento di pivot.

Esercizio 3 Sapresti proporre ora una seconda regola per la scelta dell'elemento di pivot nel tableau?

Ecco un esempio:

$$\begin{array}{l} \max \quad -x_1 - 2x_2 \\ \left\{ \begin{array}{l} -x_1 + 4x_2 \leq -2 \\ -2x_1 + 2x_2 \leq -7 \\ -x_1 - 3x_2 \leq 2 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{array} \right. \end{array} \quad \begin{array}{cccc} & x_1 & x_2 & \\ x_3 & -1 & 4 & -2 \\ x_4 & -2 & 2 & -7 \\ x_5 & -1 & -3 & 2 \\ z & 1 & 2 & 0 \end{array} \quad \longrightarrow \quad \begin{array}{cccc} & x_4 & x_2 & \\ x_3 & -\frac{1}{2} & 3 & \frac{3}{2} \\ x_1 & -\frac{1}{2} & -1 & \frac{7}{2} \\ x_5 & -\frac{1}{2} & -4 & \frac{11}{2} \\ z & \frac{1}{2} & 3 & \frac{7}{2} \end{array}$$

Nota 1 Il metodo del simplesso duale corrisponde a risolvere il problema duale attraverso il metodo del simplesso.

Il simplesso duale conviene quando l'origine non è primale ammissibile ma duale ammissibile oppure quando nel problema di PL primale il numero di vincoli supera il numero di incognite.

Come gestire i vincoli sulle singole variabili

Se invece di avere $x_j \geq 0$ si ha $x_j \geq l_j$ con $l_j \neq 0$ allora ci si avvale della sostituzione: $x'_j = x_j - l_j$. Se poi una variabile è limitata verso il basso invece che verso l'alto, ossia $x_j \leq u_j$, ma $x_j \geq 0$ non è richiesto, allora si sostituisce $x'_j = u_j - x_j$.

Qualora invece una variabile non-negativa sia limitata verso il basso, tale condizione può essere considerata come uno dei vincoli del problema. Tuttavia, qualora tutte le variabili siano limitate (ed in molti casi un limite ovvio è facilmente prodotto), allora la situazione può essere girata a nostro vantaggio considerando sia la variabile x_j che la variabile $x'_j = u_j - x_j$ e decidendo di adottare per la scrittura del primo tableau quella delle due che conduce ad un tableau duale ammissibile. Si procede quindi con il metodo del simplesso duale. Dobbiamo ovviamente garantire $0 \leq x_j, x'_j \leq u_j$. Attraverso le varie fasi del simplesso duale l'ammissibilità duale resta garantita, e se una delle variabili primali utilizzate per esprimere il tableau (x_j o x'_j) è negativa allora un passo di pivot viene eseguito con l'effetto di avvicinarsi all'ammissibilità anche primale. Tuttavia può accadere che una variabile attualmente presente nel tableau ecceda il suo limite verso il basso. Quando ciò succede si rimpiazza la rispettiva riga del tableau:

$$\begin{array}{cccccc} x'_j \text{ (o } x_j) & a_{j,1} & a_{j,2} & \dots & a_{j,n} & b_j \\ \text{con la riga:} & & & & & \\ x_j \text{ (o } x'_j) & -a_{j,1} & -a_{j,2} & \dots & -a_{j,n} & u_j - b_j \end{array}$$

e proseguendo. Ad esempio:

$$\begin{array}{l} \max \quad 3x_1 + 4x_2 \\ \left\{ \begin{array}{l} x_1 + 6x_2 \leq 3 \\ 0 \leq x_1, x_2 \leq 5 \end{array} \right. \end{array}$$

Introdotta la variabile $x'_1 = 5 - x_1$ ed $x'_2 = 5 - x_2$ si sceglie di utilizzare nel tableau proprio x'_1 ed x'_2 dacché i coefficienti della funzione obiettivo erano entrambi positivi (e quindi?).

$$\begin{array}{l} \max \quad 35 - 3x'_1 - 4x'_2 \\ \left\{ \begin{array}{l} -x'_1 - 6x'_2 \leq -32 \\ 0 \leq x'_1, x'_2 \leq 5 \end{array} \right. \end{array}$$

La sequenza dei tableau è quindi:

$$\begin{array}{ccc|ccc}
& x'_1 & x'_2 & & & \\
x_3 & -1 & \boxed{-6} & -32 & \rightarrow & x'_1 & x_3 \\
z & 3 & 4 & 35 & & z & \frac{1}{6} & -\frac{1}{6} & \frac{16}{3}
\end{array}$$

Ora $\frac{16}{3} > 5$ e pertanto la prima riga del tableau viene sostituita introducendo x_2 :

$$\begin{array}{ccc|ccc}
& x'_1 & x_3 & & & \\
x_2 & \boxed{-\frac{1}{6}} & \frac{1}{6} & -\frac{1}{3} & \rightarrow & x'_1 & x_2 & x_3 \\
z & \frac{7}{3} & \frac{2}{3} & \frac{41}{3} & & z & 14 & 3 & 9
\end{array}$$

Soluzione ottima: $x_1 = 3$ ed $x_2 = 0$ con funzione obiettivo 9.

Analisi di Sensitività

Supponiamo di massimizzare una funzione obiettivo che rappresenti un profitto o qualche altra forma di beneficio. I vincoli descriveranno limitazioni in materie prime o disponibilità. Allora i valori delle variabili duali esprimeranno il massimo “prezzo” che saremmo disposti a pagare per incrementare di un’unità la disponibilità cui la variabile duale si riferisce. (Da qui il nome di “prezzo ombra” o “valore marginale”). Ricordiamo che tuttavia il significato di un prezzo ombra è strettamente locale e che in generale non sarà conveniente continuare a pagare sulla base del prezzo ombra per un incremento comunque grande di disponibilità. Ci chiediamo ora fino a dove il prezzo ombra è significativo ossia quale sia il massimo incremento di una certa facilità che ha senso promuovere pagando il prezzo ombra. La risposta può essere prodotta agevolmente con riferimento al tableau duale.

Si consideri ad esempio di voler massimizzare il seguente profitto:

$$\begin{array}{l}
\max \quad 2x_1 + 6x_2 + 3x_3 \\
\left\{ \begin{array}{l}
x_1 + 2x_2 + 2x_3 \leq 5 \\
2x_1 + x_2 + 3x_3 \leq 6 \\
x_1, x_2, x_3 \geq 0
\end{array} \right.
\end{array}$$

dove x_1, x_2 ed x_3 esprimono dei livelli non-negativi di attività, mentre i coefficienti di destra nei vincoli impongono limiti su determinate disponibilità. Il tableau associato alla soluzione di base ottimale è il seguente.

$$\begin{array}{ccc|ccc}
& x_1 & x_2 & x_3 & & \\
x_4 & 1 & \boxed{2} & 2 & 5 & \rightarrow & x_2 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 1 & \frac{5}{2} \\
x_5 & 2 & 1 & 3 & 6 & & x_5 & \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} & 2 & \frac{7}{2} \\
z & -2 & -6 & -3 & 0 & & z & 1 & 3 & 3 & 15
\end{array}$$

Pertanto saremmo disposti a pagare (non certo più di) 1 per incrementare di un’unità la disponibilità nel primo vincolo. Ma *quanto* siamo disposti a comperare? Si consideri il duale dell’ultimo tableau:

$$\begin{array}{ccc|c}
& y_2 & y_5 & \\
y_1 & -\frac{1}{2} & -\frac{3}{2} & 1 \\
y_4 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 3 \\
y_3 & -1 & -2 & 3 \\
z & -\frac{5}{2} & -\frac{7}{2} & 15
\end{array}$$

Assumiamo di incrementare di D la disponibilità nel primo vincolo. Il vantaggio nel considerare il duale è che l’unica riga ad essere influenzata da questa modifica nel problema è l’ultima. La nuova riga può essere prodotta attraverso opportune sostituzioni o avvalendosi della PROVA DI CONTROLLO

(prova del nove) della PL.

$$\begin{array}{rcccc}
 & & (0) & (6) & \\
 & & \downarrow & \downarrow & \\
 & & y_2 & y_5 & \\
 (0) \rightarrow & y_1 & -\frac{1}{2} & -\frac{3}{2} & 1 \\
 (5) \rightarrow & y_4 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 3 \\
 (0) \rightarrow & y_3 & -1 & -2 & 3 \\
 & z & -\frac{5}{2} & -\frac{7}{2} & 15
 \end{array}$$

Ricordiamo che per ogni colonna vale quanto segue: il valore dell'ultimo elemento della colonna si ottiene sommando gli altri elementi della colonna ciascuno moltiplicato per il coefficiente della riga cui appartiene e sottraendo infine il valore del coefficiente associato alla colonna.

$$\text{Colonna 1: } -\frac{1}{2}(0) - \frac{1}{2}(5 + D) - 1(0) - (0) = -\frac{5+D}{2}$$

$$\text{Colonna 2: } -\frac{3}{2}(0) + \frac{1}{2}(5 + D) - 2(0) - (6) = \frac{-7+D}{2}$$

$$\text{Colonna 3: } 1(0) + 3(5 + D) + 3(0) = 15 + 3D$$

Pertanto la riga prodotta è:

$$-\frac{5+D}{2} \quad \frac{-7+D}{2} \quad 15 + 3D$$

Pertanto il tableau resta ottimo fintanto che D non supera 7. Concludendo 7 è il massimo incremento di disponibilità nel primo vincolo che siamo disposti ad acquistare pagando 1 per ogni unità di incremento. Per determinare il prezzo che siamo disposti a pagare per incrementi superiori (il nuovo prezzo ombra) dobbiamo eseguire un nuovo pivot.